

Free
JAN - 5 1931
Lane Medical Library
1928

Über Schweinerotlauf beim Menschen

unter besonderer Berücksichtigung
der leptischen Form, des genera-
lierten Schweinerotlaufs

Jnaugural-Dissertation

zur
Erlangung der
Doktorwürde
in der

Medizin, Chirurgie und
Geburtshilfe

der Hohen Medizinischen Fakultät
der Universität Greifswald

vorgelegt von
Hanns Hampel
aus Soldin N. M.

DRUCK DER BUCHDRUCKEREI OTTO BERGER, RHEYDT

[1929]

Eingereicht im Januar
1929

Dekan: Professor Dr. MEISNER
Referent: Professor Dr. SCHÖNFELD

MEINEM VATER!

Spiegelte der Ausdruck „Pseudoerysipiel“ oder „Erysipeloid“ früher die Rolle einer Verlegenheitsbezeichnung für alle möglichen an Erysipel erinnernden Entzündungsprozesse, so wird heute — wenn von „Erysipeloid“ gesprochen wird — gemeiniglich die von Tilbury Fox schon 1873 erkannte, in Deutschland zuerst von Rosenbach-Göttingen 1887 beschriebene akute erysipelähnliche Affektion der Finger und Hände gemeint, deren infektiöse Natur sogleich erkannt wurde, ebenso wie ihr fast regelmäßiges Vorkommen bei Personen, die irgendwie mit Fleisch, Wild, Geflügel, Fischen oder Tierkadavern in Berührung gekommen waren.

In seiner Monographie „Mikroorganismen bei den Wundinfektionskrankheiten des Menschen“ (1884) hat Rosenbach die Hautinfektion an den Händen, die von den gewöhnlichen Panaritien verschieden ist und bis dahin mit dem Namen Erysipelas chronicum, Pseudo-Erysipel, Erythema migrans bezeichnet wurde, als eine Krankheit sui generis beschrieben und Erysipeloid genannt.

Der damals gezüchtete nosogene Mikroorganismus schien zu den Kokken zu gehören. Im Jahre 1886 fand Rosenbach, daß dieser Mikroorganismus nur im ersten Anfang Kokken, d. h. Körnchen bildet, alsbald aber lange verzweigte Fäden. Es gelang dann Rosenbach auch, am eigenen Oberarm durch Impfung mit einer Reinkultur ein typisches Erysipeloid zu erzeugen, und er hat hierüber auf dem 16. Kongreß der Dtsch. Ges. f. Chirurgie 1887 Mitteilung gemacht.

In neueren Tier- und Kulturversuchen über die Art des Erysipeloid-Mikroben, speziell ob derselbe mit dem Erreger des Schweinerotlaufs und der Mäuseseptikämie identisch sei, kommt Rosenbach zu dem Ergebnis, „daß schwache und kräftige Einsaat wohl die äußere Form der Kulturen sehr beeinflussen könne aber nicht die wesentlichen und charakteristischen Unterschiede der drei Mikroben. In beiden Fällen ist die Kultur bei Schweinerotlauf die kleinste und zarteste, sie hat den kleinsten Zerstreungsbezirk und ein Zerstreungshof fehlt ganz. Bei Mäusesepsis ist die Kultur die größte, hat einen sehr großen Zerstreungsbezirk und Zerstreungshof. Erysipeloid steht in der Mitte. Dadurch wird festgestellt,

daß das Wachstum und Zerstreungsvermögen bei Schweinerotlauf am geringsten, bei Erysipeloid mittelgroß und bei Mäusesepsis am größten ist. Außerdem bieten schon makroskopisch die Kulturen in Bezug auf Größe, zierliche oder gröbere Beschaffenheit der seitlichen Triebe wesentliche Unterschiede "

Daraus, sowie aus klinischen Vergleichen des Erysipels mit der Erkrankung durch Schweinerotlaufbazillen beim Menschen zieht Rosenbach den Schluß, „daß die Morphobie so unleugbare, konstante, in allen Entwicklungsphasen hervortretende charakteristische Verschiedenheiten der drei Mikroben dargetan hat, daß ferner die klinischen Symptome ebenfalls solche Unterschiede zeigen, daß man die Identität nicht aufrecht erhalten kann, daß man vielmehr diese Krankheitserreger als verschiedene Mikroorganismen ansehen muß, welche als nah verwandte Rassen einer besonderen Gruppe angehören.“

Der Ansicht Rosenbachs gegenüber behauptet Rickmann, daß, da in morphologischer und klinischer Hinsicht bei einer größeren Anzahl von Rotlaufbazillen-Kulturen kein einwandfreier Unterschied gegenüber den Erregern des Erysipeloids und der Mäuseseptikämie ermittelt werden könnte, da außerdem der Immun- und Agglutinationswert des Rotlaufsferums sämtlichen drei Mikroben gegenüber gleich sei, diese Beobachtungen für die Identität der drei Mikroben sprechen.

Der Ansicht von Rosenbach, daß es sich um drei verschiedene, aber einer Gruppe angehörige Rassen handle, könne demzufolge nicht beigegeben werden. Die morphologischen Unterschiede der drei Rosenbachschen Mikroben könnten mit der Herkunft aus den verschiedenen Organismen des Menschen, des Schweines und der Maus, sowie langzeitiger Anpassung an diese Nährböden erklärt werden.

Im Jahre 1882 hat Löffler durch die Entdeckung des Schweinefleisches- und Rotlaufbazillus das Krankheitsbild des Schweinerotlaufes gegenüber dem allgemeinen Begriff Rotlauf und akuter Schweinefleische abgegrenzt und als scharf umrissene Erkrankung erkannt; erst ungefähr 10 Jahre später erfuhr man von der Pathogenität des Schweinerotlaufbazillus für den Menschen. Die ersten einschlägigen Mitteilungen stammen von Hillebrand und Meyer. Seitdem sind eine große Anzahl von Fällen beobachtet worden. Aber erst neuere Untersuchungen haben den bakteriologischen Beweis erbracht, daß Erysipeloid und Schweinerotlauf identische Erkrankungen sind (Rahm, Düttmann u. a.). Der unitistischen Ansicht Düttmanns und Rahms schließt sich Diemer auf

Grund von 8 Fällen, die er im Laufe des letzten halben Jahres beobachtet hatte, an. Klinisch bietet die Erkrankung immer das Bild des Erysipeloids, erst die anamnестischen Angaben bringen eine Aufklärung über die Ursache der Infektion. Bei den Fällen, wo eine eindeutige Aetiologie nicht festgestellt werden kann, ist die Entstehung der Erkrankung mit einer Infektion durch Schweinerotlaufbazillus leicht in Zusammenhang zu bringen, wenn man die außerordentliche Verbreitung des Erregers und seine große Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse berücksichtigt.

Seither sind weit über 100 Fälle bekannt geworden, von denen aber nur ein Bruchteil in die medizinische Literatur übergegangen ist, während allein die Zahl der in den Jahresveterinärberichten der beamteten Tierärzte Preußens aus dem Jahre 1901 bis 1912 veröffentlichten Fälle 97 beträgt (1912 allein 20 Fälle).

Die graphische Darstellung der Rotlaufübertragungen ergibt — im großen und ganzen — eine aufsteigende Kurve, d. h. ein von Jahr zu Jahr stärkeres Anwachsen der Erkrankungen.

Der Rotlaufbazillus, Morphologie und Biologie.

Der Rotlaufbazillus ist in seinem morphologischen Verhalten ziemlich variabel. In Präparaten aus dem Tierkörper erscheint er als sehr dünnes, $1-1\frac{1}{2}\mu$ langes, meist gerades, seltener leicht gebogenes Stäbchen. In Ausstrichen aus Kulturen sieht man auch dickere und zu längeren Fäden ausgewachsene Formen. Der Rotlaufbazillus färbt sich leicht mit allen gebräuchlichen Anilinfarben, der Gramschen Färbung gegenüber verhält er sich positiv.

An Nährsubstrate stellt er keine hohen Anforderungen, er gedeiht schon bei Zimmertemperatur auf allen Nährböden neutraler oder alkalischer Reaktion, unter anaeroben Bedingungen ebenso gut wie bei aerober Züchtung. Das Wachstum erfolgt allerdings langsam und nie sehr üppig. Besonders charakteristische kulturelle Eigenschaften kommen dem Erreger des Rotlaufs nicht zu. Allenfalls bietet sein Verhalten auf Gelatine gewisse Merkmale. Auf der Gelatineplatte entstehen sehr zarte, schleierförmige Kolonien, die bei Betrachtung mit der schwachen Vergrößerung des Mikroskops ein weißliches, fein granuliertes Zentrum und ein von diesem ausgehendes feines Fadenwerk aufweisen. Die Gelatine wird nicht verflüssigt, aber im geringen Grade erweicht, sodaß die Kolonien, wenn sie älter werden, leicht einsinken. In der Gelatinestickkultur entstehen im Stickkanal feine weiße

Pünktchen, von denen strukturlos erscheinende, feine, wolkige Trübungen ausgehen. Auf der Agarplatte entwickeln sie vom 2. bis 3. Tage kleine, glashelle, aber leicht opakerscheinende, nicht konfluierende runde Kolonien.

Im Organausstrich liegen die Bazillen einzeln, zu zweien, oder in Häufchen, oft intraleukocytär. Die Menge der Bazillen im Blute und in den Organen an Rotlauf gefallener Schweine (und auch bei Versuchstieren) kann eine sehr verschiedene sein. Wir wissen heute, daß nicht nur rotlaufkranke, sondern selbst gesunde Schweine (Bazillenträgerschweine) sowie auch andere Tiere den kurzen zarten grampositiven Mikroorganismus beherbergen können; wir kennen sein saprophytisches Vorkommen auf Fleisch gesunder Herkunft, auch der Fische, Schattiere u. a.

Durch Impfversuche mit Rotlaufbazillen an Schweinen lassen sich sämtliche Rotlaufformen künstlich erzeugen. Das Auftreten der einen oder anderen Form hängt dabei vor allem von der Menge und Virulenz der verimpften Bazillen und dem Grade der Empfänglichkeit des jeweils benutzten Versuchsschweines ab. So sah man beispielsweise, daß bei Verwendung eines durch mehrere Schweinepassagen künstlich besonders virulent gemachten Stammes sämtliche geimpften Schweine an gewöhnlichem Rotlauf erkrankten und eingingen, während bei Verwendung eines gewöhnlichen Rotlaufbazillienstammes eine schwere, eine leichte oder überhaupt keine Erkrankung an Rotlauf je nach Empfänglichkeit der Versuchsschweine herbeigeführt wurde. Auch durch Taubenpassage soll die Virulenz der Rotlaufferreger gesteigert werden können, während Kaninchenpassage sie abschwächt und auch die Form der Bazillen verändert. Daß die Formen der künstlich erzeugten Rotlaufferkrankung jedoch nicht ausschließlich auf die Virulenz der Erreger zurückzuführen ist, zeigen Versuche, die mit der gleichen Kultur an verschiedenen Schweinerassen angestellt worden sind. So erkrankte die eine Rasse nur mit leichten Backsteinblattern, während bei einer anderen mit derselben Kultur schwerste Rotlaufseptikämie erzeugt werden konnte. Von Wichtigkeit für die Art der Erkrankung ist ferner auch die Art der Einverleibung der Kulturen. Im allgemeinen soll die Aufnahme durch den Magendarmtraktus weniger gefährlich sein, als die subkutane, intraperitoneale oder intravenöse.

Nach den bisher vorliegenden Versuchen ist der Rotlaufbazillus auch für die graue und weiße Maus, für die Taube und das Kaninchen pathogen. Tauben und Mäuse erliegen der Infektion in 1—4 Tagen, doch sind auch Fälle bekannt,

in denen Mäuse bei der Verimpfung wenig virulenter Kulturen erst nach 2—3 wöchiger Krankheitsdauer starben.

Die subkutane Impfung von Kaninchen führt meist nur zu einer erysipelartigen Entzündung an der Impfstelle, in seltenen Fällen zu einem ausgedehnten entzündlichen Oedem mit tödlicher Rotlaufseptikämie, während bei intravenöser Einverleibung der Tod fast regelmäßig in 3—4 Tagen eintritt. Für Meerschweinchen sind die Schw. Erreger ebenfalls stark pathogen.

Aehnliche Bakterien.

Von ähnlichen Bakterien ist der Bazillus der Mäuseseptikämie (*Bac. murisepticus*) am längsten bekannt; R. Koch entdeckte ihn im Blute von Mäusen, die nach der Impfung mit fauler Flüssigkeit eingegangen waren. Löffler beobachtete eine unter seinen Mäusen aufgetretene und durch diesen Bazillus verursachte Seuche; John e züchtete ihn aus faulem Fleisch, Preiß aus faulem Rinderblut.

Morphologie und Kultur des *Bac. murisepticus* können unter Umständen mit jenen des Rotlaufbazillus die allergrößte Aehnlichkeit aufweisen; es können aber auch zwischen beiden unter ganz gleichen Bedingungen mehr oder minder auffallende Unterschiede hervortreten. Als solche Unterschiede bezeichnete Preiß bei seinen vergleichenden Untersuchungen: der Mäusebazillus erschien im Blute von Versuchstieren noch feiner als die Rotlaufstäbchen, während aus verschiedenen Nährböden genommen, letztere sich als dünner erwiesen. Auf der Gelatineplatte war bei *Bac. murisepticus* an der Peripherie der Verlauf der Feinästchen und Fäden radiär, und die äußersten Fäden liefen zuweilen in zierliche Schnörkel und Spiralen aus, was sich beim Rotlaufbazillus nicht zeigte. In Gelatinestickkulturen wuchs der Mäusebazillus auffallend schneller, sodaß die Kultur des Rotlaufbazillus erst nach Wochen und Monaten jene Ausdehnung erreichte, die jenem schon nach mehreren Tagen zukam; zuweilen zeigte die Stickkultur des Mäusebazillus eine konzentrische Schichtung, die der Rotlaufstäbchen aber niemals.

Alle diese Form- und Kulturdifferenzen aber können nicht mehr dazu genügen, um die beiden Bazillen als verschiedene Arten zu betrachten, denn erstens können ähnliche Differenzen auch an Rotlaufbazillen verschiedenen Ursprungs beobachtet werden, und ferner wissen wir derzeit, zwischen welch weiten Grenzen Form und Wachstum gewisser Bakterien auch künstlich variiert werden können. Dasselbe gilt in noch höherem Maße von der Virulenz, weshalb auch die negativen Impfversuche mit dem *Bac. murisepticus* an Schweinen für die

Verschiedenheit dieser Bakterien keinen Beweis abgeben können.

Wissen wir doch, daß die Virulenz der in der Natur vorkommenden Rotlaufstäbchen auch recht verschieden und veränderlich sein muß, warum sollten sie ihre Virulenz nicht auch soweit einbüßen können, daß sie Schweine überhaupt nicht mehr angreifen?

Bisher gelang es nicht, mit dem *Bac. murisepticus* an Schweinen die Läsionen des Rotlaufs zu erzeugen. Einige Ferkel, die Preiß durch Einreiben von flüssiger Kultur auf die geritzte Haut infizierte, trugen eine mäßige Rötung der Haut um die Impfstelle davon, blieben jedoch gesund; dagegen soll es Lüpke gelungen sein, durch diesen Bazillus an Schweinen Backsteinblattern hervorzurufen.

Von den kleinen Versuchstieren aber sind gerade jene, die mit Rotlaufstäbchen zu töten sind, auch für den Mäusebazillus empfänglich. Ferner gelingt es nach Lorenz, mit letzterem Kaninchen und Schweine gegen das Virus des Rotlaufs bzw. der Backsteinblattern zu immunisieren.

Man hat sonach keinen ernststen Grund, die Bazillen des Rotlaufs und die der Mäuseseptikämie als verschiedene Arten zu betrachten.“ (Preiß.)

Verbreitung des Rotlaufbazillus.

„Der Rotlaufbazillus ist außerordentlich weit verbreitet. Man findet ihn nicht nur in der Haut, in den inneren Organen und im Blut von an Rotlauf erkrankten Schweinen, auch 50% aller Schweine, die keine Spur einer Rotlaufferkrankung zeigen, sind Bazillenträger. Der Fäulnis gegenüber besitzt der Rotlaufbazillus eine große Resistenz. In faulenden Kadavern wurden noch, nachdem sie 166 Tage vergraben waren, vollvirulente Rotlaufferreger nachgewiesen (Gläser). Doch scheinen unter günstigen Bedingungen die Bazillen noch viel länger, selbst jahrelang, der Fäulnis zu widerstehen und sich sogar zu vermehren. So wird von einem Fall aus dem Kreis Elbing-Land berichtet, wo Schweine an schwerstem Rotlauf erkrankten, nachdem sie einen vor 1 Jahre an Rotlauf verendeten Schweinekadaver ausgescharrt hatten (Jahresvet. Ber. 1902). Ein weiterer Fall ist 1906 bekannt geworden. 4 Schweine erkrankten an Rotlauf, nachdem sie Runkelblätter bekommen hatten, die aus einem Garten stammten, wo einige Jahre vorher ein Rotlaufkadaver vergraben worden war. Durch Kadaver kamen wohl früher die Bazillen am häufigsten in die Gartenerde, weil ja früher Tierkadaver meist in der Nähe der Gehöfte vergraben wurden. Deshalb

trat Rotlauf ganz besonders gerne dort auf, wo selbstgezo- gene Gartenerzeugnisse verfüttert wurden. Seit in fast allen Kreisen Preußens die an Rotlauf verendeten Schweine den Tierkadaververwertungsstellen zugeführt werden müssen, scheint der eben beschriebene Uebertragungsmodus etwas seltener zu werden. Von vielen Tierärzten wird übrigens berichtet, daß immer, wenn im Frühjahr das erste Grünfutter gegeben werde, ein Anwachsen der Rotlauffälle eintrete. Diese Erscheinung wird in der Hauptsache darauf zurückgeführt, daß Rotlaufkeime aus dem Boden mit dem Grünfutter verfüttert werden. In den Boden kommen sie dann durch Stalldünger wieder hinein. Daß die Art des Bodens auch von Einfluß auf die Lebensfähigkeit der Bazillen ist, geht aus einer Mitteilung aus dem Kreis Hoyerswerda hervor (J.-V. 1902), wo immer in den Teilen des Kreises der Rotlauf seltener war, in denen Sandboden vorherrscht. Das beruht wohl in der Hauptsache darauf, daß im Sandboden der Rotlaufbazillus weit mehr seinen größten Feinden, der Luft und der Austrocknung, ausgesetzt ist, während er den feuchten, luftundurchlässigen Boden zu lieben scheint.

Der Schweinerotlaufbazillus zeigt also in seinen Lebensbedingungen und seiner Widerstandsfähigkeit eine große Ähnlichkeit mit dem Milzbrandbazillus, der ja auch vorwiegend auf feuchten, „sauren“ Wiesen zu finden ist. Bei dem Schweinerotlaufbazillus ist die Widerstandsfähigkeit nur deshalb so auffällig, weil er Sporen nicht zu bilden scheint. Wie im Boden, so findet man oft auch in kleinen Bächen, in Dorfteichen usw. Rotlaufferreger. Häufig breitet sich eine Epidemie entlang einem Flußlauf aus, in den Fleischüberreste oder Spülwasser von Rotlauffschlachtungen gekommen sind. Auch Ratten und Mäuse (Buß) spielen bei der Uebertragung eine Rolle.

Daß Menschen, besonders Schlächter, den Rotlauf übertragen können, ist bekannt. Von Seiten einiger Tierärzte wird die Zunahme der Rotlaufferkrankungen in den letzten Jahren auf die Unvorsichtigkeit bei der Impfung mit virulenten Kulturen zurückgeführt (Verschütten von Impfstoff usw.), während von anderer Seite diese Zunahme der Rotlauffälle durch die häufigere und bessere Diagnosestellung erklärt wird. Dem Pasteur'schen Impfverfahren (die Impfung allein mit virulenten Kulturen) ist jedenfalls zur Last zu legen, daß häufiger als früher Rotlaufferreger im Blut und Fleische derart geimpfter Schweine gefunden werden, die dann Anlaß zur Uebertragung der Krankheit auf den Menschen geben. Denn in solchem Fleische werden die Bazillen erst durch

längeres Kochen zerstört, nicht aber durch Einpökeln oder Räuchern. So wurden in einem geräucherten Schinken virulente Bazillen noch nach einem Vierteljahre nachgewiesen. Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß wir den Rotlaufbazillus nicht nur bei klinischem Rotlauf finden, sondern vielfach dort, wo wir ihn nicht vermuten, im Schweinefleisch, in Wasserläufen, in der Gartenerde, auf Wiesen, bei Ratten und Mäusen und sogar bei Hühnern.“ (Rahm.)

Die Resistenz des Rotlaufbazillus gegen äußere Schädlichkeiten ist ziemlich erheblich. Im Fleisch kranker Tiere wird er nach Petris Versuchen selbst durch 2½ständiges Braten oder Schmoren nicht immer abgetötet. Siedehitze vernichtet die Bazillen allerdings schnell. In gefalzenem Fleisch wurden sie noch nach einem Monat, in geräuchertem Schinken noch nach einem Vierteljahr in infektionsfähigem Zustande nachgewiesen. In beerdigten Kadavern halten sie sich nach Löfser monatelang lebensfähig. Einstündiges Erwärmen auf 70° tötet die Bazillen in einer Stunde ab, in Sonnenlicht halten sie sich 10—12 Tage lebend.

Der Schweinerotlauf ist eine über alle Länder Europas verbreitete Seuche, die den Landwirten zuweilen sehr erhebliche Verluste verursacht; einzelne Länder oder Distrikte sind besonders schwer heimgesucht.

Der Charakter der Seuche kann nicht nur in verschiedenen Ländern, sondern auch in unweit entfernten Gegenden ein sehr verschiedener sein, was sich durch die sehr veränderliche Virulenz des Erregers leicht erklärt. Während zuweilen und in manchen Gegenden die Seuche als eine gelinde, nur in wenigen Fällen tödliche Krankheit auftritt, rafft sie in anderen Gegenden 50—90 Prozent der erkrankten Tiere hinweg.

In England und den Vereinigten Staaten Nordamerikas soll der Rotlauf ausschließlich in seiner milden Form und ohne Neigung zu weiter Ausdehnung vorkommen.

Wie für die Entwicklung anderer Infektionskrankheiten Bodenbeschaffenheit und Witterung von Bedeutung sein können, so ist auch das Auftreten der Rotlaufseuche oft unverkennbar an warme und feuchte Witterung gebunden. Mit Antritt der Sommermonate und besonders in tief liegenden Gegenden mit feuchtem Boden mehren sich die Seuchenausbrüche, während sie mit Herannahen der Winterzeit sporadisch werden. Nach Lydtin soll hauptsächlich nasser, lehmiger Boden günstige Rotlauffstätten abgeben, viel weniger hingegen sandiger oder felsiger Boden. Es kann aber weder das Hochland noch die Winterzeit gegen Rotlauf geschützt genannt werden.

Hat sich irgendwo ein Rotlaufherd gebildet, so taucht die Seuche alljährlich wieder auf, wenn nicht durch eine gründliche Reinigung des Bodens oder sonst eine gründliche Aenderung der Verhältnisse stattgefunden hat.

Das Vorkommen bei Menschen ist wohl fast von jedem Praktiker beobachtet worden. So machen nach den Erfahrungen Sonntags die Erysipeloidkranken unter dem Material der chirurgischen Poliklinik in den letzten Jahren etwa 20—30 jährlich aus, wobei auf etwa 300—500 Kranke ein Erysipeloidkranker kommt. Wie andere Autoren bemerkte auch Sonntag eine Häufung zu gewissen Zeiten, namentlich im Frühjahr (März) und Herbst (Juli bis November). Betroffen sind vorwiegend Leute, die mit toten Tierstoffen (Schweine- oder sonstiges Tierfleisch, auch Wild, Fische, Krebse, Austern usw.) zu tun haben, demgemäß Tierärzte, Fleischbeschauer, Abdecker, Gerber, Austernaufmacher, Schlächter, Fleisch-, Wild- und Fischhändler, Landwirte, Krämer, Gastwirte, Köche, Köchinnen, Hausfrauen und Dienstmädchen (sog. „zoonotisches Erysipel“).

Uebertragung. Im kranken Tier finden sich die Rotlaufbazillen in allen Organen in größerer oder geringerer Menge. Ausgeschieden werden sie vorwiegend durch den Kot und Harn. Die Infektion kommt wohl am meisten dadurch zustande, daß die Erreger mit infiziertem Futter in den Verdauungstraktus bzw. Rachenraum der Tiere gelangen und von deren Schleimhäuten aus in den Körper vordringen. Ob auch Schrunden und Wunden der äußeren Haut als Eintrittspforte der Bazillen in Betracht kommen, darüber gehen die Ansichten der Autoren noch auseinander. Man kann bei Epizootien häufig schon einige Tage vor Ausbruch des eigentlichen Rotlaufexanthems bei den Tieren entzündlich veränderte Hautstellen finden, die offenbar im Anschluß an oberflächliche Abschürfungen oder Rißwunden entstanden sind. Es erscheint daher nicht ausgeschlossen, daß diese Stellen die Invasionspforten für die Erreger bildeten.

Während das Schwein vorzugsweise vom Darm aus infiziert wird, ist von einer Darminfektion beim Menschen, z. B. durch Verzehren von rotlaufbazillenhaltigem Fleisch, bisher nichts bekannt geworden. Die Infektion geht beim Menschen wohl immer von Verletzungen, kleinen Rissen und Schrunden der Haut (und zwar der Hände und Unterarme) aus. In diese Schrunden gelangen die Rotlaufferreger auf zweierlei Weise. Sie entstammen entweder dem Fleisch von rotlaufkranken Schweinen oder auch klinisch gesunden Bazillenträgern oder der Kulturspritze des Tierarztes. Dieser

letztere Infektionsmodus scheint der bei weitem häufigere zu sein. So waren von allen Infektionsfällen der Jahresveterinärberichte (1901—1912) 68 % Kulturinfektionen und nur 32 % Fleischinfektionen. Die Kulturinfektionen kommen fast ausschließlich beim Impfen durch Verletzungen mit der Kanüle der Kulturspritze oder durch Zerbrechen der Kulturröhrchen, in seltenen Fällen durch Arbeiten mit Rotlaufkulturen im Laboratorium vor, Fleischinfektionen entstehen beim Schlachten von Rotlauschweinen oder beim Verarbeiten des Fleisches von solchen Schweinen oder von Bazillenträgern, mitunter auch beim Sezieren. Einmal kam es bei einem Tierarzte durch Verspritzen von Kultur ins Auge zu einer Conjunktivitis. Ob nun *re vera* die Fleischinfektionen gegenüber den Kulturinfektionen so zurücktreten, läßt sich zur Zeit nicht entscheiden. Es wäre denkbar, daß das Ueberwiegen der Kulturinfektionen einerseits auf die einseitigen Literaturquellen, andererseits auf die mangelhafte Diagnosestellung zurückzuführen ist. Es läßt sich jedoch nicht verkennen, daß gerade durch die immer mehr an Boden gewinnende Rotlaufimpfung der Schweine der Schweinerotlauf beim Menschen von Jahr zu Jahr häufiger wird, so daß sein Krankheitsbild so allgemein bekannt zu werden verdient, wie heute z. B. das des Milzbrandes es ist.

Daß die Ansteckung gelegentlich auch an anderen Körperstellen als den Händen Eingang finden kann, zeigt Callo-mon durch Mitteilung folgender Tierarztinfektion:

„Am 9. 5. 1926 wurde Sanitätsrat Dr. C.-Hecklingen zum Tierarzt A. gerufen, der sich seit 8. 5. morgens nicht wohl fühlte und jetzt eine heftige Rötung und Schwellung am rechten Ohr bemerkte. Patient gab an, im rechten Gehörgang zuerst brennendes Jucken gefühlt zu haben, dann sei die Ohrmuschel mächtig angeschwollen; starke Schmerzen im Bereich der Nackenlymphdrüsen seien hinzugetreten, sodaß er den Kopf steif halten mußte. Schließlich habe ihn ein abends einsetzender Schüttelfrost ins Bett gezwungen; die Nacht verlief schlaflos unter Fiebergefühl. Der Kranke litt schon vorher an Ekzem des rechten äußeren Gehörganges, das er mit Wattetampons behandelte. Während einer Schweineschutzimpfung glaubt er sich dadurch infiziert zu haben, daß der Wattepfropf direkt oder durch Vermittlung seiner Finger mit virulentem Kulturmaterial in Berührung gekommen sei; auch unmittelbare Keimübertragung durch den Finger hält er für möglich.“

Ähnliche Keimübertragungen kommen vereinzelt auch am Naseneingang vor. Heller wirft gelegentlich der Erysipeloiddiskussion in der Berliner dermatologischen Gesellschaft 1924

die Frage auf, ob nicht manche jener blanden Erysipele, die sich so häufig im Gefolge von Nasen- und Unterschenkel-ulcerationen entwickeln, auch einmal durch Rotlaufübertragung hervorgerufen sein können, wobei der Finger als Ueberträger des bazillenhaltigen Materials in Frage käme. B e n c z e konnte gelegentlich der anfangs erwähnten Epidemie von 61 Fällen feststellen, daß zwar bei 70 % das Erysipeloid an Händen und Vorderarmen lokalisiert war, in den übrigen Fällen aber im Gesicht, an den Füßen und Unterschenkeln, einmal sogar bei einem 4jährigen Knaben an der Bauchhaut.

Der Nachweis des Bazillus beim kranken Schwein wie beim Versuchstier ist leicht. Man sieht ihn im Organabstrich teils einzeln oder auch zu zweien und mehreren angeordnet, nicht selten intraleukocytär; im Gewebeschnitt der Niere und Milz ist er massenhaft zu finden.

Die Diagnose des Schweinerotlaufs beim Menschen wird meist durch die Anamnese sehr erleichtert. In den meisten Fällen infizieren sich Leute, die mit Schweinen oder Schweinefleisch zu tun haben, also Fleischer, Tierärzte, Landwirte usw.

Die bakteriologische Diagnose sollte in jedem Fall von Rotlauf beim Menschen anzustreben sein. Soweit R a h m die Literatur übersehen konnte, ist dieser Forderung bisher nur selten nachgekommen worden. Häufig auch ist der bakteriologische Befund negativ gewesen, und zwar dann, wenn man nur Blut von den erkrankten Partien untersucht hat. Man kann a priori erwarten, daß im Blute nur ausnahmsweise Rotlauferreger gefunden werden können, weil ja das Krankheitsbild der Rotlaufbakteriämie beim Menschen so selten ist. Dagegen gelingt es, aus einem excidiertem Stück vom Rande der erkrankten Haut die Erreger zu züchten, wenn man dafür sorgt, daß das Hautstück nicht austrocknet. Am günstigsten sind natürlich die Wachstumsbedingungen, wenn das Hautstück sofort in Bouillon gebracht werden kann. Die unter aseptischen Kautelen ausgeführte Hautexcision ist für den Patienten vollkommen belanglos. Die genähte Haut heilt immer per primam.

Krankheitsverlauf. Während beim Schwein das Krankheitsbild der Rotlaufseptikämie so im Vordergrund steht, tritt er beim Menschen völlig zurück. Denn Störungen des Allgemeinbefindens und Fieber sind beim Menschen etwas Seltenes. Hin und wieder kommen sie aber vor; dies sind dann meist die Fälle von Allgemeininfektion mit Rotlaufbazillen, von denen später im besonderen die Rede sein soll. Die bei weitem größte Anzahl der Rotlaufkrankungen

beim Menschen verlaufen unter dem Bilde der Backsteinblattern. Es kommt in der Umgebung der infizierten Stellen (fast ausschließlich Finger, Hände und Unterarme) zu stark juckenden beetförmigen, etwa markstück- bis talergroßen roten Quaddeln, von denen in der Regel lymphangitische Streifen zentralwärts ziehen. Diese Quaddeln pflegen wie bei der Urticaria rasch zu entstehen, können auch rasch wieder verschwinden. Meist aber geht die am Anfang reine Backsteinblatternerkrankung allmählich in gewöhnlichen Rotlauf über, in dem die zuerst sehr scharfen Quaddelgrenzen verschwimmen, die Hautröte peripherwärts fortschreitet, kleine Ausläufer und Zacken entsendet, aber gegenüber der gesunden Haut nach wie vor meist eine gewisse Niveaudifferenz beibehält. Im Zentrum des Herdes beginnt die Röte mehr bläulich oder blaurot zu werden und unter mehr oder weniger starker Abschuppung abzublassen, bis schließlich nur noch eine leicht cyanotische Stelle den ursprünglichen Krankheitsherd bezeichnet. Häufig lassen sich in der allgemeinen Dermatitis noch typische Backsteinblattern lange beobachten. Mitunter aber kommt es nicht erst zur Ausbildung von Backsteinblattern, sondern die Krankheit verläuft gleich von vornherein unter dem Bilde einer diffusen Dermatitis. Man findet dann in der Umgebung der verletzten Stelle die Haut rot oder blaurot verfärbt, etwas geschwollen, starkes Jucken und Brennen, mitunter Lymphangitis und Lymphadenitis der regionären Drüsen. Incisionen führen nie auf Eiter. Allmählich wandert auch hier die Entzündung langsam weiter, bis sie nach 3—4 Wochen unter Schuppung abheilt.

Das Krankheitsbild beim Menschen ist also dem beim Schweine außerordentlich ähnlich. In beiden Fällen sind die Backsteinblattern eine mildere Form des Rotlaufs, beim Menschen eine natürlich noch bei weitem mildere als beim Schwein. Denn während beim Schwein die Backsteinblattern von Fieber bis über 40 begleitet werden, aber doch in einem höheren Prozentsatz in Heilung übergehen als andere Rotlaufformen, verlaufen sie beim Menschen fast ausschließlich fieberlos. Der weitere Verlauf der Erkrankung, d. h. der so häufig beobachtete Uebergang des Quaddelrotlaufs in die mehr diffuse Form, ist den Backsteinblattern sowohl beim Schwein als beim Menschen eigentümlich. Und schließlich wird auch die bei Schweinen häufige Blasenbildung, die durch Ansammeln eines serösen Exudates auf dem Papillarkörper zustande kommt, beim Menschen ebenfalls beobachtet.

Chronische Rotlaufformen sind beim Menschen etwas ganz ungemein Seltenes. Beim Schweine folgen in einem Teil

der Fälle der akuten Erkrankung ein längeres Siechtum mit Hautnekrosen, hartnäckigen Arthritiden und Endocarditiden. Soweit aus der Literatur ersichtlich, sind Hautnekrosen und chronische Arthritiden nach Rotlauf beim Menschen noch nicht beschrieben worden, doch kommen Herzaaffektionen nach Rotlauf vor. So berichtet Günther, daß ein Tierarzt nach Ueberstehen des Rotlaufs unter den Zeichen einer allmählich sich verschlimmernden Herzinsuffizienz erkrankte und ihr schließlich erlag. Die Sektion ergab vor allem eine Endocarditis verrucosa an der Mitralis neben einer Myodegeneratio cordis.

In einem 2. Falle kam es zu einer ulcerösen Endocarditis. Doch erfolgte hier der Tod mehr unter den Zeichen einer allgemeinen Sepsis, weshalb man den Fall der Rotlaufseptikämie zurechnen muß.

Beim Schwein beginnt die Krankheit nach einer Inkubationsdauer von 3—5 Tagen mit Mattigkeit, Verringerung der Freßlust, Somnolenz und Fieber, welches letzteres bis zu 42—43 Grad C ansteigen kann. Die kranken Tiere vergraben sich, atmen kurz und schwer; Augenlider und Bindehaut sind oft geschwollen, in den Augenwinkeln befindet sich schleimiges Sekret. Die anfangs bestehende Obstipation weicht bald einer Diarrhoe mit dünnen, zuweilen blutigen Entleerungen; auch können Schüttelfrost und Muskelzittern beobachtet werden.

Im Gegensatz zum Schwein ist beim Menschen die Inkubationsdauer verkürzt. Sie beträgt hier in der Regel 1—2 Tage. Doch sind auch Fälle bekannt, wo schon nach 12—15 Stunden, einmal sogar nach 6 Stunden die ersten Krankheits Symptome auftraten. Diese letztere Infektion kam beim Secieren eines Rotlaufschweines zustande. Es ist übrigens für die Inkubationszeit belanglos, ob es sich um eine Kulturinfektion handelt oder um eine Fleischinfektion. Bei beiden sind kürzere und längere Inkubationszeiten gesehen worden. Die kürzere Inkubationszeit beim Menschen beruht darauf, daß hier die Bazillen gleich an den Ort der Erkrankung kommen, während sie beim Schweine vorzugsweise vom Intestinaltractus aus in den Körper gelangen.

Ausgang nimmt die Krankheit von kleinen, oft unbemerkten Hautverletzungen, welche bei der Berührung mit den infektiösen Stoffen entweder bereits vorhanden sind oder gleichzeitig entstehen. Infolgedessen kann die Lokalisation des Erysipeloids an jeder Körperstelle sein. Vereinzelt sind Nase, Wangen und Hals sowie Bauch, Fuß u. a. als erkrankt

beschrieben worden. Oefters erkranken Hand und Vorderarm. Ganz überwiegend aber handelt es sich um die Finger. Hier wandert das Erysipeloid weiter, und zwar recht langsam von einem Finger auf den anderen benachbarten („wanderndes Erythem“), manchmal auch auf den Handrücken, selten noch weiter auf den Vorderarm, aber in der Regel nicht über das Handgelenk hinaus und fast nie auf die Hohlhand.

Callomon weist darauf hin, daß

1. das Erysipeloid, so sehr es sich gegenüber dem Streptokokkenerysipel durch einen im allgemeinen milden und gutartigen Verlauf auszeichnet, doch recht häufig zu einer langwierigen und störenden Affektion werden kann, namentlich infolge der Mitbeteiligung der Fingergelenke (Rotlaufarthritis) mit der Neigung zu Rückfällen noch nach Wochen und Monaten;
2. die Lokalisation an Fingern und Händen nicht die einzig und allein vorkommende ist, sondern daß auch extradigitale Infektionen möglich sind;
3. wir in der Serumbehandlung mit Rotlaufimmunserum ein Heilverfahren besitzen, daß unter den Praktikern noch viel zu wenig bekannt ist, obwohl es in hartnäckigen Fällen jede andere Behandlung zu übertreffen und gerade auf die Gelenkkomplikationen besonders augenfällig einzuwirken vermag.

Axhausen hat diese Gelenkaffektion genauer studiert und klinisch definiert; er fand sie bei 75% seiner Erysipeloidfälle. Er beobachtete nämlich in der Poliklinik eine eigenartige Erkrankung eines oder mehrerer Fingergelenke, vorzugsweise bei Frauen: spindelige Schwellung des Mittel- oder Endgelenkes bezw. mehr diffuse Schwellung der Grundgelenksgegend; Haut ohne Rötung; deutliche umschriebene Druckempfindlichkeit in der Gegend des Gelenkspaltes, besonders bei seitlichem Druck; Schmerzhaftigkeit bei der etwas gehemmten Bewegung; Röntgenbefund stets völlig normal. Am häufigsten betroffen war das Mittelgelenk der Mittelfinger, das zuweilen zusammen mit dem Endgelenk befallen war. In einzelnen Fällen war außer dem Mittelgelenk auch das Grundgelenk des gleichen Fingers erkrankt. Isolierte Erkrankungen der Endgelenke und Grundgelenke wurden selten beobachtet. An den übrigen Fingern kam die Erkrankung nur vereinzelt vor.

Gleichzeitige Häufung von Erysipeloid, oft mit nachweislicher Infektion durch direkte Uebertragung von Schweine-rotlauf, führte auf den Gedanken eines Zusammenhanges

dieser chronischen Gelenkerkrankungen mit Erysipeloid im Sinne von Residuen eines mit Gelenkerkrankungen kombinierten Erysipeloids, was sich durch weitergehende Beobachtungen bestätigte. Bei den neu hinzutretenden Fällen von Erysipeloid konnte festgestellt werden, daß etwa 75 % der Fälle mit Schwellungen der Fingergelenke verquickt waren. In fast allen Fällen konnte eine ausgesprochene umschriebene Druckempfindlichkeit der Fingergelenke festgestellt werden, die gegen die Unempfindlichkeit des Druckes auf die Phalange selber deutlich abstach. Weitere Beobachtung ergab, daß beim Abklingen der Hautrötung und der allgemeinen Fingerschwellung die Druckempfindlichkeit des Gelenkes bestehen blieb und die Schwellung der Gelenkgegend deutlich heraustrat. Den endgültigen Beweis lieferte die spezifische Behandlung mit Sufferin. Während die bisher von Axhausen geübte Behandlung des Erysipeloid mit Ruhigstellung des Fingers (mittels eines Filzstahlschiendens) nach 5—6 Tagen die Hauterkrankung in der Regel zum Verschwinden brachte (zuweilen sind aber auch dann noch Reste vorhanden oder es stellt sich bald ein Rezidiv ein, daß zu einer nochmaligen Ruhigstellung zwingt), war sie bei der Behandlung mit Sufferin in 3—4 Tagen verschwunden, ohne daß eine Ruhigstellung nötig war. Nur selten war wegen eines kleinen Restes eine zweite Einspritzung nötig. Auch auf die Gelenkerkrankungen erwies sich das Sufferin als wirksam, allerdings nicht so rasch wie gegenüber der Hauterkrankung.

Aus dem vorher Gesagten geht hervor, daß eine Infektion mit Schweinerotlaufbazillen beim Menschen fast in allen Fällen auf eine rein örtliche Erkrankung beschränkt bleiben wird. Jedenfalls sind Allgemeininfektionen sehr selten beobachtet worden. Die wenigen in der Literatur bekannten Fälle aber haben immer einen schweren, ja größtenteils letalen Verlauf genommen. Ob es sich in diesen Fällen immer um Infektionen mit vorher unbeeinflussten, also besonders stark virulenten Erregern gehandelt hat, oder ob eine durch irgend welche Zustände pathologischer Natur herabgeminderte Widerstandsfähigkeit der Betroffenen, im Sinne des Unvermögens ausreichende Schutzstoffe mobil zu machen, vorhanden war, das läßt sich in den später angeführten Fällen leider nicht nachweisen.

Den Verlauf derartiger Allgemein-Infektionen möchte ich an Hand folgender Fälle beschreiben.

Fall 1: Dieser Fall betrifft einen Patienten, den ich selbst zu beobachten Gelegenheit hatte. Bei einem Landwirt B., zu dem ich gerufen wurde, fand sich folgender Befund:

2. 9. 28. Patient klagt über schlechtes Allgemeinbefinden, Appetitlosigkeit und Schwindelgefühl. Er hat Erbrechen, heftige Schüttelfröste und die Zunge ist stark belegt. Temperatur 39,6

3. 9. Von morgens bis abends fortgesetztes Erbrechen, sehr schlechter Allgemeinzustand. Schmerzen in den Gelenken. Temperatur 40,2.

4. 9. Hohe Temperaturen unverändert; es zeigen sich morgens am rechten Unterarm quaddelartige, linsen- bis zweimarkstückgroße Hauterscheinungen. Nachmittags war der ganze Körper mit flammendroten, erhabenen, scharf umrandeten, aber ineinanderlaufenden Flecken übersät. Die Therapie erstreckte sich in diesen Tagen auf Antipyretika und kalte Packungen.

5. 9. Während des ganzen Tages bewegen sich die Temperaturen über 40. Die Nase ist stark geschwollen und sondert stark Sekret ab. Herpes labialis. Die Schmerzen in den Gelenken der Extremitäten haben sich noch vergrößert. Therapie: Cardiaca, 50 % Ichthyolvaseline auf alle Gelenke. Nachträglich stellt sich jetzt heraus, daß Patient am 1. 9. frisches Schweinefleisch, das nachweislich nicht tierärztlich untersucht war, verarbeitet hatte, sodaß an die Möglichkeit einer Rotlaufinfektion zu denken war. Am Daumen der rechten Hand befand sich eine etwa $\frac{1}{2}$ cm lange Rißwunde, die als Eintrittspforte gelten konnte.

Inzwischen eingesandtes Untersuchungsmaterial ergab auf Typhus, Paratyphus und Ruhr ein negatives Resultat. Hierauf erfolgte die Einsendung von Blut zur Untersuchung auf Schweinerotlauf.

6. 9. Temperaturen unverändert über 40. Morgens 10 ccm Susserin intramuskulär, mittags die gleiche Dosis. Abends sind die Flecken etwas blasser, die Temperatur 39,5.

7. 9. Temperatur wieder steigend, die Flecken haben wieder am ganzen Körper die anfangs geschilderte flammendrote Färbung. Die Schmerzen in den befallenen Gelenken sind außerordentlich stark. Zunge stark geschwollen. Patient sehr hinfällig, Bewußtsein gestört. Therapie: Coffein und Campher, Ichthyolpackungen auf die Gelenke.

8. 9. Nochmalige Injektion von 10 ccm Susserin intramuskulär. Abends Fallen der Temperatur auf 38,1 gegen 40,2 am Morgen. Die Schmerzen in den Gelenken sind bis auf das linke Knie etwas erträglicher.

9. 9. Temperatur weiter fallend, morgens 37,9; Allgemeinbefinden etwas besser, Bewußtsein wieder völlig klar. Die starke Schwellung des Gesichtes und der Zunge zurückgegangen.

10. 9. Bericht des Untersuchungsamtes: In der Blutkultur keine Strepto- und Staphylokokken nachweisbar, dagegen Rotlaufbazillen.

Die Flecken am Körper sind wieder etwas deutlicher sichtbar ohne daß eine Temperatursteigerung eingetreten wäre. Nochmals 5 ccm Susserin i. m.

11. 9. Die Hauterscheinungen sind wieder abgeblaßt, die Gelenke dagegen noch dauernd schmerzhaft, wenn auch nicht mehr in so starkem Maße. Therapie: 50 % Ichthyolvaseline auf die Gelenke.

In den nächsten fünf Tagen langsame, aber dauernde Besserung des Zustandes bei reger Appetitzunahme, der vorher völlig gefehlt hatte. Die Flecken am Körper traten ab und zu noch deutlich wahrnehmbar auf, verblaßten aber bald immer wieder. Am Rücken hielt die rote Zeichnung ohne Erhabenheit noch etwa sieben Tage an, um dann langsam zu verschwinden, jedoch blieben sie als pigmentierte Flecke noch sichtbar. Die Haut blättert und schält sich an den übrigen befallenen Partien. Die Temperaturen kehren im Verlauf dieser Zeit zur Norm zurück. Die Gelenke sind noch geschwollen und schmerzhaft, besonders das linke Kniegelenk.

Patient hatte sich nach etwa 4 Wochen vollkommen wieder erholt, klagte aber bei Anstrengungen und Witterungswechsel immer noch über Schmerzen in den am meisten befallenen Gelenken.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß es sich in diesem Fall um eine reine Infektion mit Schweinerotlaufbazillen gehandelt hat, die zu einer Allgemeininfektion geführt hat, also als ein Fall von „generalisiertem Schweinerotlauf beim Menschen“ anzusprechen ist.

Wenn man auch zu Beginn der Erkrankung an andere Infektionskrankheiten wie besonders Scharlach, Typhus, Paratyphus u. a. denken konnte, so mußte doch die nachträglich erhobene Anamnese und die sich daran anschließende bakteriologische Untersuchung zu dem Resultat „Schweinerotlauf“ führen. Die darauf einsetzende Serumtherapie hat ja auch die Diagnose generalisierter Schweinerotlauf vollauf bestätigt. Man ersieht ferner daraus, ein wie hervorragendes therapeutisch wirksames Mittel uns durch das Rotlaufserum für humane Medizin in die Hand gegeben ist, um selbst schwere Fälle erfolgreich zu beeinflussen.

Fall 2: Nevermann, Veröffentlichungen aus den Jahresveterinärberichten der beamteten Tierärzte Preußens für das Jahr 1905. „Der Tierarzt R. aus K. (Bez. Koslin) verletzte sich an dem zerspitterten Rande eines Kulturröhrchens unerheblich

am Finger. Nach kurzer Zeit machten sich an der Stichstelle erhebliche Schmerzen bemerkbar, sodaß R. einen Arzt zu Rate zog. Dieser behandelte den allmählich blaurot anschwellenden Arm mittels Kälte, essigsaurer Tonerde, später operativ und mittels Einspritzungen von Argentum colloidal; jedoch ohne Erfolg.

Eiterherde wurden nicht gefunden. Am 4. Krankheitstage starb B. auf dem Transport zu einer Klinik. Gesicht, Ohren, Hals und Hände des Toten waren kupferfarben oder blaurot gefärbt.“

Die Infektion durch Rotlaufbazillen wurde in diesem Falle zwar nicht lückenlos bewiesen, ist aber als Todesursache mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen.

Fall 3 und 4: Günther berichtet in der W. kl. W. 1912 Nr. 35 über zwei Fälle aus der österreichischen Veterinärliteratur, wo Schweinerotlauf beim Menschen, verursacht durch Kulturinfektionen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als Todesursache anzusehen ist. Leider sind, wie Günther hervorhebt, bei beiden Fällen die Angaben recht dürftig, die Sektion wurde nur in einem Fall ausgeführt; auch bakteriologisch scheint die Todesursache bei keinem der Patienten sichergestellt zu sein.

Bei Fall 3 handelt es sich um einen Tierarzt M. in Leonfelden (Oberösterreich), der sich am 30. 10. 02 bei Vornahme der Schutzimpfung eines Schweines gegen Rotlauf am rechten Daumen infizierte und an den Folgen seines Unfalls am 8. 2. 03 starb. Die im Auftrage einer Versicherungsgesellschaft an dem exhumierten vorgenommene Sektion ergab Schwellung der Lymphdrüsen in der rechten Achselhöhle, Degeneration des Herzfleisches, der Leber, der Nieren und Milz sowie eine frische thrombusähnliche Auflagerung an einem Zipfel der Mitrals. Aus Daten des Berichtes, sowie aus Ergänzungen dazu läßt sich weiter entnehmen, daß die lokale Affektion der Hand zwar abheilte, später aber Symptome eines Herzleidens auftraten, dem der herkulisch gebaute, früher ganz gesunde Mann schließlich erlag.

Wenn im vorliegenden Fall der Patient 3 Monate nach erfolgter Infektion an einem Herzleiden zu Grunde ging, so ist es zwar ein seltenes aber durchaus mögliches Vorkommen einer Herzerkrankung als Folgeerscheinung einer allgemeinen Rotlaferkrankung, — ein Vorkommen, wie es bei Schweinen gar nicht selten beobachtet werden kann — zumal der Patient früher „ganz gesund“ gewesen sein soll.

Bei Fall 4 handelt es sich um Tierarzt W. F. aus Langenlois (Niederösterreich), der ebenfalls an den Folgen einer

Infektion mit Schweinerotlauf zu Grunde ging. Auch bei diesem Patienten standen Erscheinungen des Herzens im Vordergrund des Krankheitsbildes; im Bericht heißt es: in kurzer Zeit zeigten sich Symptome von beginnender Sepsis und zugleich trat eine stürmische Endocarditis hinzu. Als Todesursache wurde Endocarditis ulcerosa, Sepsis, angegeben. Hierzu bemerkt noch Günther: „Gewiß sind diese Daten sehr mangelhaft; es kann sich in diesen Fällen um eine gewöhnliche Art der Sepsis, also um Strepto- oder Staphylokokkeninfektionen gehandelt haben. Allein es ist in diesem Zusammenhange sicher recht bemerkenswert, daß auch beim Tier der Stäbchenrotlauf häufig unter dem Bild einer allgemeinen Sepsis auftritt und daß die Rotlaufendocarditis beim Schwein eine oft vorkommende, den Tierärzten wohlbekannte Komplikation darstellt, an der die Tiere zumeist noch nachträglich zu Grunde gehen.“

Fall 5: In der Allg. med. Ztrltzg. Nr. 1 berichtet Fisser: „Ein Tierarzt verletzte sich am 17. 9. 12 bei einer Bullenkastration am Nagelglied des lk. Mittelfingers. Er bedeckte die Wunde mit einem Heftpflaster und setzte die im Gang befindlichen Rotlaufimpfungen von Schweinen fort, wobei er die eingespritzten Kulturen mit dem Daumen und Zeigefinger oder Mittelfinger der lk. Hand unter der Haut zerquetschte und zerknetete. Rutschte dabei das Pflaster vom lk. Mittelfinger ab, so legte er ein neues auf, ohne zu überlegen, daß vielleicht eine aus der Stichöffnung wieder ausgetretene Kleinigkeit von Kulturen mit dem verletzten Finger in Berührung gekommen wäre. Am 25. 9. wurde ich zu ihm gerufen. Der Patient lag stark fiebend zu Bett und erzählte, daß er am 23. 9. am lk. Arm einen Ausschlag bemerkt hatte, sowie das Gefühl der Spannung an der Stelle der ursprünglichen Wunde. Am Abend desselben Tages hatte er Schmerzen im Hals und den ganzen Tag Fieber. In der Nacht hatte er nicht geschlafen, keinen Appetit, großen Durst. Befund: An den Armen und am ganzen Bauch ein weit verbreitetes Exanthem, das besonders in der Bauchgegend an Scharlach erinnerte. Derselbe Befund am nächsten Tag. 39,4 Puls 120. Klagen über rheumatoide Schmerzen im ganzen Körper, besonders in den Armen. Nachmittags Verschlechterung. Völliger Appetitmangel, unstillbarer Durst; Temp. 39,8; Puls 130. Am lk. Oberschenkel Flecken, wie sie nach Angaben des Patienten für Rotlauf charakteristisch seien. Meist runde, aber auch viereckige Flecken, die etwas über das Niveau der Haut erhaben sind, in der Mitte öfter abgeblaßt, wodurch der dunkle Rand noch etwas mehr hervortritt, etwa in der Größe

eines Zweimarkstückes. Das charakteristische Aussehen geht völlig verloren, wenn zwei oder mehrere Flecken miteinander verschmelzen, was die anfängliche Diagnose Scharlach veranlaßte.

Injektion von 15 g Rotlaufferum, auf drei Stellen des lk. Oberschenkels verteilt. Am anderen Tag Zustand nicht verändert: Klagen über lähmungsartigen Zustand der Arme und über heftige Schmerzen in der Brust. Ich injizierte wieder 20 g Serum, da ich kein anderes Mittel weiß, um das letale Resultat abzuhalten und würde nach einiger Zeit nochmals 20 g injiziert haben, wenn nicht inzwischen von Professor Günther in Wien, an den wir uns um Rat gewandt hatten, die Nachricht eingelaufen wäre, von weiteren Injektionen einstweilen Abstand zu nehmen. Am anderen Morgen Allgemeinbefinden besser; der unstillbare Durst hat nachgelassen, noch große Mattigkeit, als wenn der ganze Körper gelähmt wäre. Die Schmerzen in den Arm- und Brustmuskeln noch dieselben, sodaß auch der geringste Gebrauch der Arme unmöglich ist. Ausschlag bedeutend blässer geworden, charakteristische Flecken kaum noch zu finden. Nach zwei Tagen von dem Ausschlag überhaupt nichts mehr sichtbar; Appetit kehrt allmählich wieder und Patient fängt an, nachts zu schlafen. Nach etwa 8 Tagen Abschuppung, besonders an den Extremitäten. Nach 14 Tagen ist der Patient geheilt.“

F. schließt mit folgenden Worten: „Es unterliegt für mich keinem Zweifel, daß es sich in diesem Falle um eine Infektion von Rotlaufferkrankung, hervorgerufen durch Aufnahme von virulenten Kulturen in den verletzten lk. Mittelfinger, gehandelt hat. Dadurch kam eine Allgemeinerkrankung, die septische Form von Rotlauf zustande.“

Fall 6: Prausnitz, Bakteriologische Untersuchungen über Schweinerotlauf beim Menschen. (Aus d. hyg. Inst. d. Univ. Breslau.)

In den letzten Jahren kamen in Breslau 4 Fälle vor, davon 3 nur lokale Entzündungen betreffend. Der 4. Fall, von Mendel in der Universitätskinderklinik beobachtet, betraf ein zehnjähriges Mädchen, daß an einem kongenitalen Herzfehler (wahrscheinlich offenen Ductus Botalli) litt und akut fieberhaft erkrankte; nach einigen Tagen eigenartige, leicht erhabene Erythemeruptionen an verschiedenen Körperstellen; daran anschließend Gelenkschmerzen. Fieber blieb dauernd hoch, es entwickelte sich das Bild einer chronischen Sepsis, die anscheinend mit Endocarditis kompliziert war. Exitus nach etwa 6 Monaten; Sektion konnte nicht ausgeführt werden.

„Im Verlauf der Krankheit wurde wiederholt aus dem Blute ein Bazillus in Reinkultur gezüchtet, der hier als

Schweinerotlaufbazillus identifiziert wurde. Die Zahl der Keime betrug, wenn die Blutentnahme auf der Fieberhöhe gemacht wurde, mindestens 1 im Kubikzentimeter. Die aus Blutbouillon gezüchteten Bazillen waren zarte, unbewegliche, leicht färbbare, grampositive Stäbchen, die auf Agar und Ascitesagar in sehr feinen Kolonien, in der Gelatine in feinem Stichkanal mit mäßig zahlreichen seitlichen, strahlenförmigen Ausläufern wuchsen.“

Auch aus den Agglutinationsversuchen mit Schweinerotlaufserum des Landsberger Institutes und mit Höchster Immunsérum ergab sich eine weitgehende Übereinstimmung zwischen dem echten Schweinerotlaufstamm und der Kultur aus dem Venenblut der Patientin. Wenn auch der menschliche Stamm durch einen mindestens zweimonatigen Aufenthalt im menschlichen Körper eine Anpassung an diesen Organismus und eine leichte Abwandlung seiner ursprünglich vielleicht vorhandenen höheren Beeinflussbarkeit durch das tierische Rotlaufserum erfahren, gleichzeitig aber eine höhere spezifische Agglutinierbarkeit durch das menschliche homologe Serum erworben hatte, was in Unterschieden der Agglutination zum Ausdruck kam, so war jedenfalls von einer ausgesprochenen Serumfestigkeit der Kultur nicht die Rede. Es bestand daher die Hoffnung, das Kind noch durch Serum zu retten, was aber nicht gelang. Die an zwei aufeinander folgenden Tagen ausgeführte intramuskuläre Injektion von zusammen 150 ccm Höchster Serum blieb auf das Krankheitsbild ohne jeden Einfluß, was im auffallenden Widerspruch zu der guten Wirkung des Serums beim Tier und auch bei menschlichen Erkrankungen steht. Die im weiteren Verlauf der Krankheit ausgeführten Versuche mit chemotherapeutischen Mitteln (kolloid. Silber, Optochin, Trypaflavin) und mit Normalmenschenbluttransfusionen blieben ebenfalls wirkungslos auf die Bakteriämie und auf das klinische Bild.

Auch der Infektionsweg blieb unaufgeklärt. Eine ausgesprochen lokale Infektion fehlte. Ob eine der erythematösen Stellen, die besonders stark blaurot verfärbt war, als solche aufgefaßt werden konnte, war zweifelhaft; dagegen sprach nach Ansicht von Pr. die Lokalisation (am Rücken). Ein Jahr vor seiner Erkrankung war das Kind zum Ferienaufenthalt auf einem Gut gewesen, wo die Schweine an Rotlauf erkrankt waren. Aber ob hier ein Zusammenhang konstruiert sein kann, scheint recht fraglich. Eher wäre an die Möglichkeit zu denken, daß eine Orale oder intestinale Infektion ausnahmsweise vorgelegen hätte. Es ist sichergestellt, daß die Rotlaufbazillen sehr häufig auf den Mandeln und im

Darmkanal anscheinend gesunder Schweine und nicht selten bei Erkrankungen von Rindern, Schafen, Geflügel vorkommen. Bekannt ist ihre außergewöhnlich hohe Widerstandskraft gegen Pökeln, Räuchern und gegen Fäulnis. Daher ist in Zeiten, wo nur ein sehr beschränkter Teil des genossenen Fleisches einer geordneten Fleischschau unterworfen wird, die Infektionsgefahr durch Fleischgenuß besonders groß. Für den Ausgang vorliegenden Falles könnte möglicherweise der schwere Herzfehler und die dadurch zweifellos bedingte geringere Kampfkraft des Kindes gegen bakterielle Invasionen eine gewisse Rolle gespielt haben.

Fall 7: Düttmann, Schweinerotlauf und Erysipeloid. Btr. z. kl. Chir. 1921, Bd. 123.

„35jähriger Schreiner, der am 2. 9. 20 nachts ein Schwein schlachtete, das angeblich an Rotlauf erkrankt war. Am 4. 9. an der Wurzel des lk. Zeigefingers eine erbsengroße rote Stelle an einer kleinen Rißwunde; am nächsten Tag vergrößerte sich die Rötung und Schwellung immer mehr und nahm am folgenden Tag dauernd zu. Schließlich der ganze Handrücken befallen. Am 23. 9. Rötung der lk. Hand mehr blaurot; außerdem blaurote Flecken am lk. Vorderarm. Jucken und Brennen auch an der rechten Hand und beiden Fußrücken; an diesen Stellen die gleichen blauroten Flecken. Sonstigen Ausschlag am übrigen Körper will Patient nicht bemerkt haben. Befund: Herz und Lunge o. B. Lk. Handrücken stark geschwollen; Schwellung mehr hart als ödematös, Hautfarbe blaurot. Am Grundgelenk des lk. Zeigefingers (Beginn der Infektion) schilfert sich die Haut feinlamellös ab. Haut des distalen Unterarmendes mit zahlreichen kleinen blauroten, etwas erhabenen, gewöhnlich erbsengroßen Flecken besät, die mit ihrem blauroten Hof sich ziemlich scharf von der Umgebung abheben. Die gleichen Hauterscheinungen auf den Fingerrücken beider Hände und auf beiden Fußrücken. Drüschenschwellung nirgends nachweisbar. 27. 9. Exzision zur bakteriologischen Untersuchung. Da Sufferin nicht vorhanden, 0,5 ccm Caseosan (Lindig) intravenös. Am 28. 9. nochmalige Injektion von 2 ccm Caseosan intravenös, da eine Besserung noch nicht eingetreten war. Am 29. 9. Schwellung des Handrückens zurückgegangen, Haut runzelt sich. Blaurote Verfärbung abgeblaßt, aber noch deutlich. Blaurote Erhabenheiten flacher Niveaudifferenz nicht mehr festzustellen, dagegen heben sie sich als blaurote Fleckchen mit braunrotem Hof scharf ab. Abends nochmal 2 ccm Caseosan intravenös. Bakteriolog.: Schweinerotlaufbazillen, Streptokokken (schwach hämolytisch) und weißwachsende Staphylo-

kokken. 30. 9. Schwellung am Handrücken zurückgegangen, kein Spannungsgefühl, Jucken und Brennen hat seit gestern aufgehört. Blaurote Flecken stark abgeblaßt, aber immer noch zu erkennen. 1. 10. Bei hochgehobenem Arm sind die Rötung und Schwellung verschwunden, kommen aber beim Herabhängen des Armes noch eben sichtbar zum Vorschein. Auf eigenen Wunsch entlassen. Während der ganzen Krankheitsdauer Temperatur normal. Keine Störung des Allgemeinbefindens.“

Düttmann bemerkt dazu, daß die Cafeosaninjektionen zweifellos zu einer Heilung geführt haben, daß er aber doch den Eindruck gehabt habe, als ob das spezifische Serum, das Sufferin, schneller eine Restitutio ad integrum herbeigeführt hätte und fährt fort: „Um eine rein lokale Erkrankung kann es sich in dem letzten Fall nicht gehandelt haben, vielmehr ist ein Uebertreten der Bazillen in den Kreislauf sicher. Die Infektionsstelle war die lk. Hand, die Rotlauferscheinungen traten auch auf der rechten Hand und an beiden Füßen auf und waren hier sehr deutlich. Die Eruption erfolgte nach Angaben des Kranken regelmäßig unter Brennen und Jucken. Irgendwelches Unbehagen verspürte der Patient nicht dabei; Schüttelfröste waren nicht aufgetreten.“

Fall 8: Sieben, Generalisierter Schweinerotlauf beim Menschen, M. Kl. 1925, Nr. 4.

Der 32jähr. Bahnarbeiter K. Sch., der 24jähr. Fabrikarbeiter H. Sch. und dessen Mutter Frau Sch., 50 Jahre alt. Die letzten beiden hatten ein Erysipeloid an der Beugeseite des rechten Vorderarmes bzw. auf dem linken Handrücken, ausgegangen von einer kleinen Hautwunde in diesen Gegenden. Der erste Patient hatte eine 5 cm lange Rißwunde auf dem linken Handrücken, von der sich ein Erysipeloid ausbreitete. Alle drei Patienten wurden mit Umschlägen mit Sublimatlösung behandelt. Bei den beiden Sch's. heilte die Krankheit nach etwa 10 Tagen. Bei dem Bahnarbeiter H. trat nach 8 Tagen hohes Fieber auf (40,5). „Der Kranke machte einen schwer septischen Eindruck, klagte während einer Reihe von Tagen über rasende Kopfschmerzen, die durch die üblichen Mittel kaum gelindert wurden, auch wurden Gliederschmerzen und großes Schwächegefühl geäußert, zudem stellte sich allmählich auch etwas Benommenheit ein. Am 2. Fiebertage zeigten sich auf dem Rücken drei rote Flecken von etwa Talergröße, in der Mitte eine Papel. Schnell vergrößerten sich dieselben bis zur Größe eines Tellers und gingen mit ihren Rändern ineinander über. Das Zentrum dieser Kreisflächen war tief scharlachrot, etwas größer als ein Fünf-

markstück, während der übrige Teil der Fläche nur blaßrot war. Die Grenze der dunkleren Flächen im Zentrum war scharf ausgeprägt. Es erscheinen dann bald noch andere Effloreszenzen von Pfenniggröße, ebenfalls im Zentrum eine Papel zeigend, die sich rapid vergrößerten und dieselbe Beschaffenheit, wie die oben erwähnten, hatten. So noch weitere auf dem Rücken, in der rechten Glutäalgegend, an den Oberschenkeln, am rechten Vorderarm, an der rechten Hand und zwei an der Stirn. Während die meisten Affektionen in ihrem Verlauf identisch waren, zeigten die auf der Stirn ein ganz abweichendes Verhalten. Die eine erreichte nur die Größe eines Fünfmärkstücles, die andere nur die eines Einmärkstücles. Sie zeigten beide eine tiefblauröte, später braunrote Farbe und waren dicht mit kleinen Bläschen von Hirsekorngröße völlig bedeckt. Nach 5 Tagen trat allmählich Entfieberung ein, die Hautaffektionen verblaßten allmählich; zuletzt heilten die auf der Stirn ab, es trat dann im weiteren Verlauf völlige Genesung ein.

Das Bild war so charakteristisch, wie man es sicher bei keinem Exanthem findet. Von besonderem Interesse sind auch die Bläscheneruptionen an der Stirn.“ Letztere sind mit dem beim Tier vorkommenden Bläschenauschlag identisch. Bezüglich der Serumbehandlung sagt Sieben, daß er beim Ausbruch der Allgemeinerkrankung sich überlegt habe, ob eine solche am Platze sei. Beim Erysipeloid habe er sie immer entbehren können, da dieses nach Sublimatumschlägen oder in etwas hartnäckigeren Fällen nach Ichthyolpinjelungen bald verschwindet. Es scheine ihm daher fraglich, ob dem Serum wirklich bei dem Erysipeloid ein Heilerfolg zuzuschreiben sei. Dennoch glaubt er, daß bei einer so schweren Infektion, wie der von ihm mitgeteilten, eine Serumbehandlung doch versucht hätte werden können.

Daß es in dem eben beschriebenen Fall zu einer Allgemeininfektion gekommen war, ist wohl sicher einer individuellen Disposition zuzuschreiben, denn bei den beiden anderen Personen, die sich an derselben Quelle infiziert hatten, kam es nur zu einem lokalen Erysipeloid. Daß es überhaupt gewöhnlich beim Erysipeloid, d. h. bei einer Lokalinfection bleibt, hat wohl sicher Grund darin, daß sofort beim Beginn der Infektion, d. h. der Vermehrung der Keime in der Wunde und ihrer Umgebung eine Aktivierung der Immunkörper einsetzt, welche einer Allgemeininfektion einen Schutzwall entgegenwerfen. Daraus erklärt sich auch das einerseits äußerst seltene Vorkommen, andererseits aber der sehr schwere Verlauf des generalisierten Schweinerotlaufs beim Menschen,

Zusammenfassend wäre also nochmals hervorzuheben, daß der generalisierte Schweinerotlauf beim Menschen ein zwar seltenes Vorkommen ist, aber im eingetretenen Fall unter den Erscheinungen einer schweren Infektionskrankheit wie hohen Temperaturen, Bewußtseinstörungen und den typischen Erscheinungen der Haut bezw. der Gelenke abläuft. Die Diagnose wird sich meistens leicht aus der Anamnese und dem bakteriologischen Untersuchungsbefund (Probeexzision) stellen lassen.

Am Schluß der Abhandlung möchte ich betreffs der Therapie noch einige kurze Bemerkungen anfügen. Die Therapie des generalisierten Schweinerotlauf dürfte in den von verschiedenen chemisch-pharmazeutischen Fabriken hergestellten Rotlaufsera für humane Medizin ein gut wirkendes Mittel zur Hand haben, das in einer Dosis von 1 ccm pro 10 kg Körpergewicht intramuskulär injiziert wird. Die Möglichkeit des Auftretens eines Serumexanthems ist nicht ausgeschlossen, aber immerhin ein seltenes Vorkommen. Es wird davor gewarnt, zur Behandlung des Rotlaufs beim Menschen Serum zu verwenden, das für Veterinärzwecke bestimmt ist. Während für letzteres Keimfreiheit nicht vorgeschrieben ist, sind Sera für Humanmedizin durch Sterilfiltration keimfrei gemacht.

Neben der Serumtherapie ist dann noch eine symptomatische Behandlung der befallenen Hautpartien und Gelenke erforderlich, die in der bekannten antiphlogistischen Therapie des Erysipels zu suchen ist. (Sublimatumschläge, Umschläge mit Liq. al. acet., Resorzin, Ichthyolalbenverbände, Jodtinkturpinselfungen u. a. m.) Auch haben sich Höhen- und Sonnenbestrahlungen, bei denen es zu erheblichem Lichterythem kommen soll und jede kranke Stelle bestrahlt werden soll, als wirksam erwiesen.

Zum Schluß sei mir noch gestattet, meinem lieben Vater für seine Hilfe und Herrn Prof. Dr. Schönfeld für lebenswürdiges Entgegenkommen und Unterstützung besonders zu danken.

Literatur:

- Acel: Zur Aetiologie des Erysipeloids (Zentrallabor. d. Krankenhäuser d. Jüd. Gemd., Budapest) — D. m. W. 1924, No. 29, S. 988.
- Axhausen: Zur Diagnostik der Fingergelenkserkrankungen (Chirurg. Univ-Klin. Charite, Berlin) — Kl. W. 1923, No. 48, S. 2197—2198.
- Bierbaum und Göttron: Beitrag zur Erysipeloidfrage (Berl. Derm. Gef. Sib. 8. Juli. 1924). — Derm. Z[schrift]. 1925, Bd. 43, S. 52—58.
- Callomon: Zur Klinik und Serumtherapie des Erysipeloids. — Derm. Wch[schrift]. 1927, Bd. 84, S. 189—195.
- Diemer: Zur Frage des Erysipeloids (Chirurg. Univ-Klinik Freiburg). — Kl. Wch[schrift]. 1923, No. 22 S. 1022—1024.
- Kolle W. und H. Heßch: Die experimentelle Bakteriologie und die Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Immunitätslehre. — 6. Aufl., Bd. 1, Berlin-Wien 1922, Urban und Schwarzenberg, S. 626—652, Schweinerotlauf.
- Preiß: Rotlauf der Schweine, Erysipelas rhusopathia suum. — In: Kolle, W. und A. v. Waffermann, Hdb. d. pathog. Mikroorganismen, 3. Aufl., Bd. 6, S. 449—489. Jena, Berlin—Wien 1928. G. Fischer u. Urban u. Schwarzenberg.
- Rahm: Der Schweinerotlauf beim Menschen (Aus der Chirurg. Kl. Breslau) Beiträge zur klinischen Chirurgie 1919, Bd. 115, S. 664—677.
- Rahm: Zur Schweinerotlaufarthritis der Fingergelenke (Chir. Univ-Klin. Breslau). — Kl. W. 1924, No. 6, S. 224—226.
- Rickmann: Zur Frage der Identität der Erreger des Schweinerotlaufs, des Erysipeloids und der Mäusesäptikämie. — Z[schrift]. f. Hyg. 1909, Bd. 64, S. 362—364.
- Rosenbach: Experimentelle morphologische und klinische Studie über die Krankheitserregenden Mikroorganismen des Schweinerotlaufs, des Erysipeloids und der Mäusesepsis. — Z[schrift]. f. Hyg., Bd. 63 S. 343—371.
- Sonntag: Über das Erysipeloid und seine Behandlung (Chirurg. Polikl. Inf. Univ. Leipzig). — Fortschritte der Therapie 1925 Jg. 1, Nr. 3, S. 70—72.

Lebenslauf.

Hanns, Paul, Josef Hampel, geboren am 4. Februar 1892 zu Soldin i. d. Neumark, als Sohn des San -Rats Josef Hampel und seiner Ehefrau Anna geb. Rundau. Aufgewachsen im Elternhause, besuchte ich bis zu meinem 10. Lebensjahre die Mittelschule zu Soldin und erhielt nebenher Unterricht im Latein. Von 1903 bis 1910 besuchte ich das Gymnasium zu Frankfurt a. O. bis zur Unterprima Bestand im September 1910 in Berlin das Fähnrichexamen und trat im Oktober 1910 als Fahnenjunker in das ehemalige Feldartillerie-Regiment v. Clausen Nr. 21 in Neisse ein. Im Sommer 1912 trat ich zur Reserve über, machte in Friedland in Mecklenburg im September 1913 mein Abiturienten-Examen und studierte dann in Greifswald i. P. Medizin. Am 1. Mobilmachungstage in die Armee wieder eingestellt, machte ich den Krieg mit als Batterieführer und Flugzeugbeobachter bis zum November 1918. Nach Beendigung des Krieges nahm ich mein Studium wieder auf, das ich — durch eine Kriegsbeschädigung mehrfach zur Unterbrechung gezwungen — im Februar 1923 durch das Staatsexamen in Leipzig beendete. Ich habe mich dem Sonderfach der Dermatologie zugewandt und übe seit Oktober 1927 in Magdeburg meine eigene Praxis aus. Seit 1922 bin ich mit der Tochter des verstorbenen Direktor O. Elft verheiratet.

